

# FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN MP-ASI DINI PADA BAYI USIA 0-6 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ROWOSARI

DIAH WIDIAWATI- 25000118120111  
2023-SKRIPSI

Puskesmas Rowosari merupakan salah satu puskesmas di Kota Semarang yang mempunyai cakupan ASI eksklusif cukup rendah yaitu sebesar 56,25% pada tahun 2021 dikarenakan bayi sebelum 6 bulan sudah mendapatkan MP-ASI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian MP-ASI dini pada bayi usia 0-6 bulan di wilayah kerja Puskesmas Rowosari. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain *cross sectional*. Populasi dari penelitian ini seluruh ibu yang mempunyai bayi usia 6-11 bulan di wilayah kerja Puskesmas Rowosari dengan subjek penelitian didapatkan sebanyak 76 orang menggunakan teknik *consecutive sampling*. Analisis statistik yang digunakan adalah uji *chi-square* dan *contingency coefficient*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempunyai hubungan antara pemberian MP-ASI dini adalah pengetahuan (CC=0,325 p=0,011), sikap (CC=0,343 p=0,006), kecukupan ASI (CC=0,341 p=0,004), paparan media (CC=0,254 p=0,022), peran petugas kesehatan (CC=0,238 p=0,032), dukungan keluarga (CC=0,461 p=0,000) serta kebiasaan pemberian makan bayi dalam masyarakat (CC=0,234 p=0,036). Faktor yang tidak menunjukkan hubungan yaitu antara pemberian MP-ASI dini dengan pendidikan (CC=0,109 p=0,636) dan status bekerja ibu (CC=0,046 p=0,690). Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian MP-ASI dini pada bayi usia 0-6 bulan di wilayah kerja Puskesmas Rowosari adalah pengetahuan, sikap, kecukupan ASI, paparan media, peran petugas kesehatan, dukungan keluarga dan kebiasaan memberikan makan pada bayi dalam masyarakat.

Kata Kunci : MP-ASI dini, pengetahuan, sikap, kecukupan ASI, dukungan keluarga