

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara kuantitatif, faktor-faktor yang terbukti merupakan risiko kejadian putus berobat pasien tuberkulosis
  - a. Seseorang yang gagal mempelajari pengalaman diri sendiri berisiko 34,025 kali lebih besar untuk terkena putus berobat dibandingkan seseorang yang berhasil mempelajari pengalaman diri sendiri.
  - b. Seseorang yang gagal memcontoh keberhasilan orang lain berisiko 20,271 kali lebih besar untuk terkena putus berobat dibandingkan seseorang yang berhasil mencontoh keberhasilan orang lain.
  - c. Seseorang yang tidak mendapatkan persuasi verbal dari lingkungannya berisiko 10,504 kali lebih besar untuk terkena putus berobat dibandingkan seseorang yang mendapatkan persuasi verbal dari lingkungannya.
  - d. Seseorang yang memiliki kondisi fisik dan emosional yang tidak baik berisiko 12,713 kali lebih besar untuk terkena putus berobat dibandingkan seseorang yang memiliki kondisi fisik dan emosional yang baik.

2. Secara kualitatif, ada beberapa responden yang tidak melakukan pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan, melainkan melakukan pengobatan mandiri ke dukun kampung. Sehingga responden tidak menyelesaikan pengobatan tuberkulosis hingga tuntas dan mengalami putus berobat.

## **B. Saran**

1. Bagi Instansi Kesehatan

Meningkatkan upaya promosi kesehatan untuk terus mendorong masyarakat agar turut serta membantu memberikan dukungan sosial kepada pasien Tuberkulosis. Selain itu diharapkan agar memberikan edukasi yang mantap kepada pasien agar bisa menyelesaikan pengobatan.

2. Bagi Pasien Tuberkulosis

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan banyaknya pasien Tuberkulosis yang mengalami putus berobat. Diharapkan bahwa pasien Tuberkulosis dapat lebih memanfaatkan sumber-sumber dukungan baik dari keluarga, lingkungan serta puskesmas dengan lebih maksimal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Perlu dilakukan penelitian dengan variabel lain untuk mengetahui faktor apa saja yang berhubungan dengan kejadian putus berobat pengobatan pasien tuberkulosis.