

ABSTRAK

Latar Belakang : Salah satu penyebab kematian ibu adalah kehamilan ektopik. Terdapat beberapa faktor risiko kehamilan ektopik, yaitu usia, IUD, paritas, riwayat kehamilan ektopik, riwayat operasi panggul dan abdomen, infertilitas, riwayat PID, riwayat abortus, dan perawatan infertilitas.

Tujuan : Membuktikan faktor-faktor tersebut berhubungan terhadap kehamilan ektopik di RSUP Dr. Kariadi.

Metode : Penelitian observasional analitik dengan desain kasus control ini melibatkan 134 sampel, yang terdiri dari kehamilan ektopik ($n=67$) dan abortus imminens sebagai kontrol ($n=67$) yang dipilih dengan metode *purposive sampling* serta diambil dari catatan medis pasien tahun 2019 – 2024. Analisis data dilakukan dengan uji bivariat dengan uji Chi Square dan Fisher Exact serta uji multivariat dengan uji regresi logistik.

Hasil : Terdapat hubungan bermakna antara riwayat kehamilan ektopik ($p = 0,034$), riwayat abortus ($p = 0,002$), dan infertilitas ($p = 0,009$) terhadap kehamilan ektopik. Variabel lainnya tidak berhubungan terhadap kehamilan ektopik. ($p>0,05$). Terdapat dua faktor risiko yang berpengaruh terhadap kehamilan ektopik yaitu riwayat abortus ($p = 0,001$; aOR = 3,516; 90% CI 1,846 – 6,697) dan infertilitas ($p = 0,005$; aOR = 2,913; 90% CI 1,563 – 5,431).

Kesimpulan : Terdapat hubungan antara riwayat kehamilan ektopik, riwayat abortus, dan infertilitas terhadap kehamilan ektopik sedangkan variabel lain tidak

berhubungan terhadap kehamilan ektopik. Riwayat abortus dan infertilitas merupakan faktor risiko yang berpengaruh secara sendiri maupun bersama-sama terhadap kehamilan ektopik.

Kata Kunci : *Kehamilan ektopik, Faktor Risiko*