

ABSTRAK

Latar Belakang : Pengukuran kualitas hidup penting untuk pengambilan keputusan dalam pengobatan. Pemberian regimen kemoterapi yang berbeda tentunya akan mengakibatkan efek samping berbeda sehingga berpengaruh pada kualitas hidup.

Tujuan : Mengetahui perbedaan kualitas hidup pasien kanker payudara yang memperoleh kemoterapi FAC dan AC. Selain itu, untuk mengetahui hubungan antara faktor kualitas hidup dengan kualitas hidup pasien kanker payudara.

Metode : Penelitian merupakan observasional analitik dan rancangan penelitian berupa *cross – sectional*. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner QOL – BC. Uji bivariat dilakukan dengan *Mann – Whitney, Spearman Rank*, dan *Chi Square*.

Hasil : Terdapat perbedaan yang bermakna pada kualitas hidup pasien kanker payudara yang memperoleh kemoterapi FAC dan AC ($p\ value = 0,005$). Terdapat hubungan antara regimen kemoterapi dengan kualitas hidup ($p\ value < 0,05$), namun usia, jenis kanker payudara, lama sakit, stadium kanker, tingkat ekonomi, dan waktu tidur tidak berhubungan dengan kualitas hidup pasien ($p\ value > 0,05$).

Kesimpulan : Terdapat perbedaan kualitas hidup pasien kanker payudara yang memperoleh kemoterapi FAC dan AC. Terdapat hubungan antara regimen kemoterapi dengan kualitas hidup. Usia, jenis kanker payudara, lama sakit, stadium kanker, tingkat ekonomi, dan waktu tidur tidak berhubungan dengan kualitas hidup pasien.

Kata Kunci : *Kanker Payudara, FAC, AC, kualitas hidup, kemoterapi.*