

Pertumbuhan Batang, Akar dan  
Daun Gulma Katumpangan  
(*Pilea microphylla* (L.) Liebm.)  
Stems, Roots and Leaves  
Growth of Ketumpang (*Pilea  
microphylla* (L.) Liebm.) Weeds

*by* Sri Darmanti

---

**Submission date:** 01-Jul-2020 12:53PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1352112267

**File name:** Akar\_dan\_Daun\_Gulma\_Katumpangan\_Pilea\_microphylla\_L.\_Liebm..pdf (241.23K)

**Word count:** 1474

**Character count:** 9133

**Pertumbuhan Batang, Akar dan Daun Gulma Katumpangan (*Pilea microphylla* (L.) Liebm.)**

**Stems, Roots and Leaves Growth of Ketumpang (*Pilea microphylla* (L.) Liebm.) Weeds**

**Agustina Tri Hapsari<sup>1\*</sup>, Sri Darmanti<sup>2</sup>, Endah Dwi Hastuti<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Biologi, Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro

<sup>2</sup>Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang

\*Email: athapsari288@gmail.com

Diterima 28 Desember 2017 / Disetujui 25 Januari 2018

**PENDAHULUAN**

Pertumbuhan tanaman adalah peristiwa bertambahnya ukuran tanaman, yang dapat diukur dari bertambah besar dan tingginya organ tumbuhan, sedangkan perkembangan tanaman dapat dilihat dengan adanya perubahan pada bentuk organ batang, akar dan daun, munculnya bunga serta terbentuknya buah. Pertambahan

ukuran tubuh tumbuhan secara keseluruhan merupakan hasil dari penambahan jumlah dan ukuran sel (Sitompul dan Guritno, 1995).

Gulma merupakan tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan, dengan ciri khas pertumbuhannya cepat, mempunyai daya saing kuat dalam memperebutkan faktor tumbuh, mempunyai kemampuan toleransi yang tinggi terhadap cekaman lingkungan, mampu

berkembang biak secara generatif atau vegetative dengan baik dengan alat perkembangbiakan yang mudah tersebar dan bijinya dapat mengalami dormansi sehingga dapat bertahan hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan (Nasution, 1986). Di Indonesia gulma *Pilea microphylla* (L.) Liebm. dikenal dengan nama katumpangan, akar nasi, atau jalu-jalu babudo, sedangkan di Amerika dan Hawaii dikenal dengan nama *artillery plant*, *baby puzzle*, *pistol plant*, *gun powder plant* atau *rock weed* yang banyak hidup di daerah lembah dan berlumut. Gulma ini dapat digunakan sebagai obat batuk, penyakit sendi, asma, bronkitis, diare pada anak-anak, disentri, penyakit perut dan usus, diuretik, dan untuk pengobatan luka dan memar (Asprey dan Thornton, Burkill, 1996; Eisai, 1995; 2006; Facey *et al.*, 1999; Hirschhorn, 1992 dalam Syafni 2009).

Sebagian besar penelitian *Pilea microphylla* (L.) Liebm. yang telah dilakukan terfokus pada aspek fitokimia. Beberapa penelitian tentang *Pilea microphylla* (L.) Liebm. yang pernah dilakukan antara lain pengaruh ekstrak etanol herba *Pilea microphylla* (L.) Liebm. terhadap kadar asam urat dalam urin mencit betina (Sembiring, 2006), uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol dan fraksi dari herba *Pilea microphylla* (L.) Liebm. (Syafni, 2009), aktivitas antioksidan, antimikroba, dan uji toksisitas *Pilea microphylla* (L.) Liebm. (Chaharhehiet *et al.*, 2010), kandungan flavonoid dan fenol yang cukup tinggi pada *Pilea microphylla* (L.) Liebm. sebagai obat diabetes melitus pada masyarakat Cina (Bansal *et al.*, 2011). Masih sedikit informasi tentang pertumbuhan dan anatomi *Pilea microphylla* (L.) Liebm. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan anatomi batang, akar dan daun *Pilea microphylla* (L.) Liebm dengan membandingkan organ muda dan dewasa.


#### METODE PENELITIAN

Bahan yang digunakan yaitu gulma *Pilea microphylla* (L.) Liebm., sedangkan alat utama yang digunakan yaitu mikrotom dan fotomikrograf. Sampel *Pilea microphylla* (L.) Liebm. diambil secara acak. Dibuat preparat penampang lintang batang, akar dan daun muda


serta dewasa dengan metode parafin (Sass, 1958). Preparat penampang bujur daun muda dan dewasa dibuat dengan metode replika. Batang muda adalah 2 cm dari ujung batang, sedangkan batang dewasa 2cm dari pangkal batang. Akar muda 0,5 cm dari ujung akar, sedangkan akar dewasa 0,5 cm dari pangkal akar. Daun muda yang berukuran panjang helai daun 0,3cm dan terletak di bagian ujung batang, sedangkan daun dewasa yang berukuran panjang helai daun  $\pm 0,7$ cm dan terletak di bagian tengah dekat dengan pangkal batang. Organ yang diukur adalah diameter batang, diameter lumen sel xilem batang, diameter akar, diameter lumen sel xilem akar, lebar daun, dan kerapatan stomata.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran dan analisis diameter batang muda dan dewasa menunjukkan bahwa secara signifikan diameter batang dewasa lebih besar dibanding dengan diameter batang muda (Gambar 1.) Pengukuran dan analisis diameter akar muda dan dewasa menunjukkan bahwa secara signifikan diameter akar dewasa lebih besar dibanding dengan diameter akar muda (Gambar 2.) Diameter batang dan akar dewasa berukuran lebih besar dibandingkan dengan diameter batang dan akar muda disebabkan karena batang maupun akar mengalami pertumbuhan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sitompul dan Guritno (1995) bahwa pertumbuhan merupakan proses kehidupan tanaman yang mengakibatkan perubahan ukuran tanaman yang semakin besar. Pertambahan ukuran tubuh tumbuhan secara keseluruhan merupakan hasil dari pertambahan jumlah dan ukuran sel. Batang *Pilea microphylla* (L.) Liebm. termasuk ke dalam dikotil herba, namun kambiumnya tidak aktif bekerja sehingga menyebabkan batangnya tidak dapat membesar seperti dikotil berkayu pada umumnya. Sedangkan pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan memanjang organ karena aktivitas meristem pada bagian ujung tanaman. Menurut Mulyani (2006), sel meristem merupakan sel yang terus-menerus membelah sehingga menambah jumlah sel-sel tubuh tumbuhan dan membentang sehingga ukuran sel bertambah besar.



Gambar 1. Diameter (µm) batang *Pilea microphylla* (L.) Liebm. muda dan dewasa



Gambar 2. Diameter (µm) akar *Pilea microphylla* (L.) Liebm.

Pengukuran dan analisis diameter lumen sel xilem batang *Pilea microphylla* (L.) Liebm. menunjukkan bahwa secara signifikan diameter lumen sel xilem batang dewasa lebih besar dibanding dengan diameter lumen sel xilem batang muda (Gambar 3.). Pengukuran dan analisis diameter lumen sel xilem akar *Pilea microphylla* (L.) Liebm. menunjukkan bahwa secara signifikan diameter lumen sel xilem akar dewasa lebih besar dibanding dengan diameter lumen sel xilem akar muda (Gambar 4.). Diameter lumen sel xilem batang dan akar dewasa lebih besar dibandingkan dengan diameter lumen sel xilem batang maupun akar muda hal ini disebabkan karena batang maupun akar mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan batang dan akar yang membesar dikarenakan bertambahnya ukuran sel penyusun batang maupun akar, yang salah satunya adalah sel xilem. Hal ini sesuai


dengan pendapat Fahn (1995) yang menyatakan bahwa pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran bukan hanya berupa volume, tetapi juga dalam hal bobot dan jumlah sel. Xilem merupakan jaringan kompleks yang terdiri atas beberapa tipe sel. Xilem terdiri atas sel-sel pengangkut seperti trakeid dan anggota pembuluh (trakea) maupun serat dan parenkima. Sel-sel yang terpenting adalah trakea. Sel trakea merupakan sel yang berbentuk silinder yang ketika dewasa sel ini akan mati dan bagian ujungnya akan bersatu sehingga membentuk tabung yang berfungsi untuk menyalurkan air.

Berkas pengangkut batang herba *Pilea microphylla* (L.) Liebm. tersusun atas xilem dan floem, bertipe kolateral dengan kambium tipis dan tidak menyambung. Tipe berkas pengangkut kolateral yaitu tipe berkas pengangkut di mana xilem dan floem terletak berdampingan. Menurut


Fried dan Hademenos (2006), pada batang herba dikotil ditemukan berkas vaskular yang berbentuk cincin dengan masing-masing berkas mengandung massa floem di bagian luar dan massa xilem yang lebih besar di bagian tengah. Terdapat jaringan meristematik di antara xilem dan floem yang disebut kambium vaskular.

Berkas pengangkut akar *Pilea microphylla* (L.) Liebm. pada penampang lintang akar terlihat terletak pada bagian paling dalam dengan bertipe

radial. Tipe berkas pengangkut radial yaitu tipe berkas pengangkut di mana xilem dan floem tersusun berselang-seling bergantian menurut arah jari-jari lingkaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Fried dan Hademenos (2006) bahwa pada irisan melintang akar herba dikotil umumnya xilem berinding tebal tersusun dalam bentuk melintang seperti palang di bagian tengah silinder fibrovaskular, sedangkan sel-sel floem terletak di sudut-sudut bagian yang melintang tersebut.




Gambar 3. Diameter ( $\mu\text{m}$ ) lumen sel xilem batang *Pilea microphylla* (L.) Liebm.



Gambar 4. Diameter ( $\mu\text{m}$ ) lumen sel xilem akar *Pilea microphylla* (L.) Liebm.

Pengukuran dan analisis diameter lebar daun *Pilea microphylla* (L.) Liebm. menunjukkan bahwa secara signifikan diameter lebar daun dewasa lebih besar dibanding dengan diameter lebar daun muda (Gambar 5.) Daun dewasa memiliki ukuran lebar daun yang lebih besar dibandingkan dengan daun muda hal ini dikarenakan daun juga mengalami pertumbuhan. Hal ini sesuai dengan


pendapat Sitompul dan Guritno (1995) yang menyatakan bahwa pertumbuhan merupakan proses dalam kehidupan tanaman yang mengakibatkan perubahan ukuran tanaman semakin besar dan juga yang menentukan hasil tanaman. Pertambahan ukuran tubuh tumbuhan secara keseluruhan merupakan hasil dari pertambahan jumlah dan ukuran sel.



Gambar 5. Lebar ( $\mu\text{m}$ ) daun *Pilea microphylla* (L.) Liebm.

Pengukuran dan analisis kerapatan stoma pada daun *Pilea microphylla* (L.) Liebm. menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kerapatan stoma daun dewasa dibanding dengan kerapatan stoma daun muda (Gambar 6.). Daun dewasa memiliki kerapatan stoma yang lebih rapat dibandingkan dengan daun muda dikarenakan jumlah stoma pada daun dewasa lebih banyak dibandingkan dengan daun muda. Semakin banyak jumlah stoma, maka semakin tinggi tingkat kerapatan stoma. Hal ini

sesuai dengan penelitian Sulaeman dkk. (2013) yang menyatakan bahwa kerapatan stoma sangat tergantung pada jumlah stoma, karena semakin banyak jumlah stoma, maka semakin tinggi tingkat kerapatan stoma. Fahn (1991), dalam Paluvi dkk. (2015) menyatakan bahwa semakin tinggi intensitas cahaya, kerapatan stoma di permukaan daun semakin meningkat. Kerapatan dan jumlah stoma yang banyak merupakan proses adaptasi dari tanaman terhadap kondisi lingkungannya



Gambar 6. Kerapatan stomata daun *Pilea microphylla* (L.) Liebm.

## **KESIMPULAN**

Pertumbuhan batang, akar dan daun *Pilea microphylla* (L.) Liebm. ditunjukkan dengan terjadinya penambahan diameter batang dan diameter lumen xilem batang, penambahan diameter akar dan diameter lumen xilem akar, penambahan lebar daun dan kerapatan stoma.

# Pertumbuhan Batang, Akar dan Daun Gulma Katumpangan (Pilea microphylla (L.) Liebm.) Stems, Roots and Leaves Growth of Ketumpang (Pilea microphylla (L.) Liebm.) Weeds

## ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[fr.scribd.com](https://fr.scribd.com)

Internet Source

1%

2

[www.artiini.com](http://www.artiini.com)

Internet Source

1%

3

Rutdiana Zai, Untung Sudharmono. "The Effectiveness of Boiled Rosy Periwinkle (Catharanthus roseus) in Decreasing SGOT and SGPT Value of Male Wistar Strain Rats with Acute Hepatitis Model", Abstract Proceedings International Scholars Conference, 2019

Publication

1%

4

[www.digilib.brawijaya.ac.id](http://www.digilib.brawijaya.ac.id)

Internet Source

1%

5

[ejournal.undip.ac.id](http://ejournal.undip.ac.id)

Internet Source

1%

6

[bcatatanadetya.blogspot.com](http://bcatatanadetya.blogspot.com)

Internet Source

1%



7 Lince Meriko. "STRUKTUR STOMATA DAUN BEBERAPA TUMBUHAN KANTONG SEMAR (Nepenthes spp.)", BERITA BIOLOGI, 2018 1%

---

Publication

8 Jimmy Sangi, J. L.P Saerang, F.J Nangoy, J Lihat. "PENGARUH WARNA CAHAYA LAMPU TERHADAP PRODUKSI TELUR BURUNG PUYUH ( Coturnix coturnix japonica )", ZOOTEK, 2017 1%

---

Publication

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

# Pertumbuhan Batang, Akar dan Daun Gulma Katumpangan (Pilea microphylla (L.) Liebm.) Stems, Roots and Leaves Growth of Ketumpang (Pilea microphylla (L.) Liebm.) Weeds

---

## GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

**/0**

GENERAL COMMENTS

**Instructor**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---