

Kualitas Air dan Pertumbuhan Semai *Avicennia marina* (Forsk.) Vierh pada Lebar Saluran Tambak Wanamina yang Berbeda

by Endah Dwi Hastuti

Submission date: 07-Jan-2020 10:41AM (UTC+0700)

Submission ID: 1239683705

File name: C28.pdf (505.15K)

Word count: 2600

Character count: 16021

Kualitas Air dan Pertumbuhan Semai *Avicennia marina* (Forsk.) Vierh pada Lebar Saluran Tambak Wanamina yang Berbeda

Water Quality and The Growth of *Avicennia marina* (Forsk.) Vierh Seedling on Different Wanamina embankment canal

Nimas Ayu Suryani^{1*}, Endah Dwi Hastuti², Rini Budihastuti²

¹Program Studi Biologi, Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro

²Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang

*Email :nimasayusuryani@gmail.com

Diterima 30 Juli 2018 / Disetujui 28 September 2018

PENDAHULUAN

Hutan mangrove merupakan ekosistem kompleks yang memiliki flora dan fauna yang beraneka ragam yang hidup di air maupun darat.

Mangrove menurut Giesen *et al.*, (2007) didefinisikan sebagai tipe tanaman berkayu yang hidup di lingkungan asin dan payau. Vegetasi mangrove memiliki peran penting pada ekosistem.

Mangrove dapat menahan nutrisi melalui pengikatan oleh partikel-partikel lempung dalam ekosistem mangrove (Saenger, 2002). Melimpahnya nutrisi yang terkumpul di ekosistem mangrove ini dimanfaatkan oleh berbagai jenis biota sebagai tempat mencari makan (*feeding ground*), pemijahan (*spawning ground*) dan asuhan (*nursery ground*). Wanamina (*silvofishery*) merupakan pola pendekatan teknis yang terdiri atas rangkaian kegiatan terpadu antara kegiatan budidaya ikan atau udang dengan kegiatan penanaman, pemeliharaan, pengelolaan dan upaya pelestarian hutan mangrove (Fitzgerald, 2002). Budidaya tambak dengan sistem wanamina telah dikembangkan di wilayah Mangkang, Semarang selama beberapa tahun terakhir. Tidak hanya mendukung pertumbuhan vegetasi mangrove, tambak wanamina juga mendukung keberlangsungan hidup biota di tambak seperti ikan, udang, kepiting.

Jenis mangrove yang dominan ditemukan di wilayah pesisir Kecamatan Tugu, Mangkang antara lain jenis *Avicennia marina* yang dapat dikategorikan sebagai tanaman perintis dalam komunitas hutan mangrove (Halidah dan Kama, 2013). *Avicennia marina* dapat tumbuh dengan baik apabila lingkungannya memiliki salinitas sekitar 0 – 30‰ dengan batas toleransi maksimal hingga 85‰ (Robertson & Alongi, 1992). Tambak yang digunakan dalam penelitian ini memiliki susunan seri yang berurutan dari satu plot dengan plot yang lain, sehingga memiliki aliran air satu arah. Tambak wanamina yang digunakan pada penelitian, mangrove ditanam terpisah dengan tambak dalam beberapa hamparan berselang-seling yang menjadi bagian dari saluran air inlet dan outlet tambak yang bersangkutan. Mangrove ditanam pada lebar saluran yang berbeda yaitu 1m, 2m, dan 3m dengan jarak tanam masing-masing semai 1m. Beberapa faktor kimia dan fisika yang diamati pada penelitian ini diantaranya; suhu dan salinitas. Kualitas air yang tidak sesuai untuk pertumbuhan mangrove akan mempengaruhi pertumbuhan vegetasi mangrove serta perkembangan ikan yang dibudidayakan.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu ingin

mengetahui bagaimana kualitas air pada lebar saluran tambak yang berbeda terhadap pertumbuhan semai *Avicennia marina*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kualitas air yang baik untuk pertumbuhan semai *Avicennia marina* sebagai bahan pertimbangan dalam rehabilitasi lingkungan mangrove dimasa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di tambak wanamina di wilayah pesisir Desa Mangunharjo, Kelurahan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu, Semarang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 dengan pengamatan lapangan dilakukan secara berkala dengan periode pengamatan setiap 2 minggu sekali selama 4 bulan. Pengamatan semai dilakukan dengan menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter batang. Pengamatan kualitas air dilakukan dengan menggunakan *Water Quality Checker* untuk mengukur suhu dan salinitas pada air tambak.

Pengamatan dilakukan pada lahan tambak yang memiliki susunan seri yang berurutan dari satu plot dengan plot lain, sehingga memiliki aliran air satu arah dengan luas kolam tambak 5 x 5m. Saluran tambak dibuat disamping tambak. Luas saluran bervariasi yaitu 1m, 2m, dan 3m (dengan panjang saluran yang sama yaitu 5m). Setiap lebar saluran yang berbeda, yaitu lebar 1m, 2m, dan 3m, ada 6 semai yang diamati. Perhitungan data dan grafik ditentukan dari hasil perhitungan selisih (Δ) antara pertumbuhan akhir dan pertumbuhan sebelumnya atau $\Delta = t_n - t_o$.

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK), yang terdiri dari 3 perlakuan lebar saluran (1m, 2m, dan 3m) dengan 6 kali ulangan. Pengaruh kualitas air pada lebar saluran tambak wanamina yang berbeda terhadap kelulushidupan semai mangrove *Avicennia Marina* diamati pada akhir pengamatan dan untuk mengetahui data persentase kelulushidupan semai dihitung dengan menggunakan rumus Effendi (1997), yaitu:

$$SR = \frac{Nt}{No} \times 100\%$$

*Kualitas Air dan Pertumbuhan Semai *Avicennia marina* (Forsk.) Vierh pada Lebar Saluran Tambak Wanamina yang Berbeda*

Keterangan:

SR : Tingkat Kelulushidupan (%)

No : Jumlah semai yang hidup pada awal pengamatan (semai)

Nt : Jumlah semai yang hidup pada akhir pengamatan (semai)

Analisis data statistik melibatkan uji ANOVA. Analisis statistik dengan ANOVA antara lain untuk mengetahui pengaruh lebar saluran tambak yang berbeda terhadap kualitas lingkungan air dan pertumbuhan semai *A. marina*. Data yang diperoleh diuji pola distribusi dan homogenitasnya terlebih dahulu, dan dilanjutkan dengan uji *Analysis of Variance* (ANOVA), yang dilanjutkan dengan *Duncan Multi Range Test* (DMRT) dengan taraf kepercayaan 95%. Sementara analisis deskriptif dilakukan untuk memaparkan hasil penelitian yang didukung dengan referensi yang

berkaitan dengan penelitian. Analisis data dengan ANOVA dilakukan dengan SPSS 19 dengan selang kepercayaan 95%.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Suhu

Hasil analisis ANOVA menunjukkan adanya beda nyata pada lebar saluran yang berbeda terhadap suhu ($p < 0,05$). Berdasarkan uji lanjut, pengamatan suhu pada lebar saluran 1 m dan 2 m menunjukkan adanya perbedaan yang nyata dengan lebar saluran 3 m pada setiap periode. Dapat dilihat pada Tabel 1 rerata suhu pada lebar 2 m memiliki nilai yang paling tinggi yaitu sebesar 32,8 °C sedangkan pada lebar 1 m dan 3 m dengan nilai sebesar 32,7 °C dan 31,9 °C.

Tabel 1. Rerata suhu (°C) kualitas air pada lebar saluran yang berbeda

Lebar Saluran Tambak Wanamina			
	1 m	2 m	3 m
Suhu (°C)	32,7 ^b ±1,39	32,8 ^b ±1,51	31,9 ^a ±1,47



Gambar 1. grafik perubahan suhu air pada lebar saluran yang berbeda

Gambar 1 menunjukkan suhu air pada lebar 1 m dan 2 m lebih tinggi dibandingkan saluran dengan lebar 3 m, hal ini disebabkan penetrasi cahaya pada saluran dengan lebar 1 m dan 2 m lebih banyak dan karena kurangnya naungan yang menutupi saluran dari sinar matahari. Berdasarkan grafik yang terlihat pada Gambar 1, tampak bahwa suhu air cenderung mengalami penurunan dari awal hingga akhir pengamatan pada setiap lebar saluran tambak yang berbeda. Suhu air tertinggi terdapat saluran dengan lebar 2 m pada periode 1 yaitu sebesar 34,55°C

dan suhu terendah terjadi pada lebar 3 m di periode ke-4 yaitu sebesar 30,90°C. Berdasarkan grafik tersebut, suhu yang terdapat pada saluran tambak wanamina merupakan suhu yang baik untuk mendukung pertumbuhan *Avicennia marina*. Menurut Fajar, dkk (2013), suhu yang baik untuk pertumbuhan mangrove tidak kurang dari 20 °C dan perbedaan suhu musiman tidak melebihi 5 °C.

Suhu berperan penting dalam proses fisiologis, yaitu fotosintesis dan respirasi. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, suhu tidak memberikan pengaruh yang signifikan


terhadap pertumbuhan diameter *A.marina*, hal ini dikarenakan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, suhu berkisar dari 30,90 - 34,55°C. Menurut Lopez Hoffman *et al*, (2006) dalam Hastuti dkk (2012) menyebutkan bahwa suhu lingkungan berhubungan dengan proses fotosintesis vegetasi mangrove. Pertumbuhan *A.marina* terhambat pada suhu 37 °C, saat suhu mengalami kenaikan, pertumbuhan *A.marina* melambat hingga terhenti dan tidak tumbuh lagi.

Salinitas

Data salinitas tidak dianalisis dengan uji ANOVA dikarenakan data salinitas tidak memiliki pola distribusi yang normal serta tidak seragam ($p < 0,05$), sehingga tidak dapat dilakukan uji lanjut. Dapat dilihat pada Tabel 2, rerata salinitas yang paling tinggi yaitu pada lebar 1 m sebesar 27%, sedangkan tidak berbeda jauh dengan lebar 1 m, nilai rerata lebar 2 m dan 3 m yaitu sebesar 26.9% dan 26.2%.

Tabel 2 Rerata salinitas (‰) kualitas air pada lebar saluran yang berbeda

Salinitas (‰)	Lebar Saluran Tambak Wanamina		
	1 m	2 m	3 m
	27	26.9	26.2



Gambar 2. Grafik perubahan salinitas air pada lebar saluran yang berbeda

Salinitas air mengalami kenaikan dari awal penelitian sampai akhir penelitian, yaitu dari musim penghujan ke musim kemarau. Menurut Hadikusumah (2008), terjadinya perubahan salinitas dalam suatu aliran disebabkan oleh adanya perubahan sirkulasi yang menyebabkan terjadinya perubahan densitas air. Gambar 2 menunjukkan bahwa salinitas air yang tertinggi terdapat pada lebar saluran tambak 3 m di periode ke- 6 yaitu sebesar 31,88 %, sedangkan salinitas terendah terdapat pada lebar saluran tambak 3 m di periode ke- 1 yaitu sebesar 21,6%. Gambar grafik salinitas yang terlihat merupakan hasil yang baik untuk mendukung pertumbuhan semai *A.marina* yang didukung oleh pendapat Hastuti (2012) yaitu salinitas dan pertumbuhan *Avicennia* memiliki korelasi positif dimana peningkatan salinitas akan merangsang pertumbuhan *Avicennia*. Kisaran salinitas terbaik untuk pertumbuhan bibit *Avicennia* adalah 5 – 30 ‰. Berdasarkan hal

tersebut, nilai salinitas pada penelitian merupakan nilai yang sesuai untuk pertumbuhan mangrove, karena nilai salinitas pada penelitian berkisar antara 21-30 ‰. Namun demikian, kadar salinitas memiliki kisaran yang tinggi pada periode-periode akhir pengamatan saat terjadinya musim kemarau (bulan Mei - Juni), sehingga pertumbuhan semai menurun. Walaupun mangrove toleran terhadap kadar salinitas yang tinggi, proses adaptasi mangrove agar dapat bertahan hidup dengan cara menyimpan Na dan Cl pada bagian kulit kayu, akar dan daun yang lebih tua. Daun yang menyimpan garam lalu menggugurkan diri untuk mengeluarkan kelebihan garam yang dapat menghambat pertumbuhan dan pembentukan buah.


Ion Na⁺ dan Cl⁻ pada salinitas diperlukan mangrove di dalam mengatur potensial osmotik antarsel (Onrizal, 2005). Salinitas merupakan akumulasi garam yang terkandung pada tanah dan dapat terdispersi ke dalam air dengan adanya

pergerakan air. Kondisi *hypersaline* (kadar salinitas yang tinggi) dapat menghambat pencampuran nutrisi pada air tambak (Wolanski, 1986 dalam Andutta *et al*, 2011). Mangrove pada umumnya dapat beradaptasi pada lingkungan dengan salinitas tinggi karena mangrove memiliki akar nafas yang membantu untuk mengambil oksigen di udara apabila kekurangan oksigen pada media tanamnya, lentisel untuk pertukaran karbondioksida dan oksigen dalam membantu proses pertumbuhan batang dan trikoma garam yang menyerap air pada lingkungan salinitas tinggi kemudian mengekskresikan garam dengan trikoma glandulae yang terdapat pada daun. Apabila

trikoma glandulae pada permukaan bawah daun pecah, akan muncul butiran putih seperti tepung.

Diameter Batang

Diameter batang dari semai *Avicennia marina* diukur pada ketinggian 30 cm dari pangkal akar. Pertumbuhan diameter batang merupakan pertumbuhan sekunder yang disebabkan oleh adanya jaringan kambium, yaitu jaringan yang mengakibatkan batang bertambah besar (Triharso, 2004). Pertumbuhan diameter berlangsung apabila keperluan hasil fotosintesis untuk respirasi, pergantian daun, pertumbuhan akar dan tinggi telah terpenuhi (Latifah, 2004).



Gambar 3. Grafik pertumbuhan diameter batang semai *avicennia marina* pada lebar saluran yang berbeda

Gambar 3 menunjukkan adanya pengaruh lebar saluran 1 m, 2 m, dan 3 m terhadap pertumbuhan diameter batang semai *Avicennia marina*. Lebar 1 m dan 2 m menunjukkan pertumbuhan diameter batang semai yang cukup baik dibandingkan lebar saluran 3 m. Pertumbuhan diameter batang paling tinggi pada lebar 1 m terjadi pada periode 4 yaitu sebesar 0,14 cm. Pada lebar 2 m pertumbuhan diameter batang yang paling tinggi terjadi pada periode 6 yaitu sebesar 0,34 cm. Pada lebar 3 m pertumbuhan diameter batang yang paling tinggi terjadi pada periode 4 yaitu sebesar 0,12 cm.

Pertumbuhan diameter semai dipengaruhi oleh aktivitas jaringan meristem yakni meristem lateral. Meristem lateral atau meristem samping adalah meristem yang menyebabkan pertumbuhan ke arah samping (membesar), terletak sejajar dengan permukaan organ. Aktivitas jaringan

meristem lateral menimbulkan pertambahan diameter tumbuhan. Pertumbuhan diameter semai *Avicennia marina* sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang menjadi tempat tumbuhnya. Pertumbuhan diameter berlangsung apabila keperluan hasil fotosintesis untuk respirasi, pertumbuhan akar dan tinggi telah terpenuhi (Latifah, 2004).

Pertumbuhan diameter batang sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya salinitas air. Salinitas yang tinggi dapat mengganggu aktivitas dari meristem lateral. Kurniasari, dkk (2010) menyatakan bahwa gangguan pada meristem lateral terjadi akibat keterbatasan penyerapan air oleh akar yang disebabkan oleh tingginya tekanan osmotik dalam larutan tanah akibat adanya NaCl. Diameter batang sangat dipengaruhi oleh terjadinya perkembangan sel baru, pemanjangan dan penebalan dinding sel, proses tersebut sangat

mempunyai karbohidrat dan absorbs air bagi pembesaran vakuola-vakuola pada semua bagian yang sedang mengalami pertumbuhan (Harjadi, 1993).

Kelulushidupan Semai

Kelulushidupan yaitu perbandingan antara jumlah individu yang hidup pada akhir percobaan dengan jumlah individu pada awal percobaan. Kelulushidupan dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik seperti parasit, kompetitor, predasi, umur, kemampuan adaptasi, penanganan

manusia dan kepadatan populasi, sedangkan sifat kimia dan fisika dari suatu lingkungan air merupakan faktor abiotik. (Rika, 2008).

Salah satu faktor penting yang diamati dalam penelitian ini yaitu tingkat kelulushidupan (*survival rate*) semai mangrove yang ditanam pada lebar saluran tambak wanamina yang berbeda. Tingkat kelulushidupan semai mengindikasikan kesesuaian kondisi lingkungan bagi kehidupan mangrove yang ditanam. Hasil pengamatan terhadap tingkat kelulushidupan semai mangrove yang ditanam pada lebar saluran tambak wanamina yang berbeda disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Tingkat Kelulushidupan (*Survival Rate / SR*) Semai *Avicennia Marina*

Jenis Mangrove	Lebar Saluran	Jumlah Awal Semai	Jumlah Akhir Semai	Keterangan	SR
<i>Avicennia marina</i>	1 m	6	1	Hidup	17%
	2 m	6	2	Hidup	33%
	3 m	6	0	Mati	0%

Hasil analisis terhadap tingkat kelulushidupan semai mangrove menunjukkan kisaran yang sangat rendah pada semai *Avicennia marina*. Tingkat kelulushidupan yang rendah tersebut diakibatkan oleh perubahan kondisi lingkungan dari musim penghujan ke musim kemarau yang menyebabkan rendahnya masukan air tawar. Menurut Hutching dan Saenger (1987) dalam Kusmana (2000) kisaran temperatur optimum untuk pertumbuhan *Avicennia marina* pada temperatur 18°-20 °C sedangkan pada pengamatan berlangsung, temperatur melebihi batas optimum untuk pertumbuhan semai *Avicennia marina* yaitu 31°-34°C.

Tingkat kelulushidupan semai pada saluran dengan lebar 2 m lebih tinggi yaitu sebesar 33% dibandingkan lebar 1 m dan 3 m yaitu sebesar 17% dan 0 %. Hal ini dapat disebabkan pada lebar 2 m mangrove mendapatkan ruang yang cukup untuk tumbuh serta suplai nutrient yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tercukupi berbeda dengan lebar 3 m yang memiliki jumlah spesies lebih banyak dibandingkan lebar 2 m dan lebar 1 m yang memiliki ruang cukup kecil untuk pertumbuhan. Hal ini sesuai dengan pendapat Utina, dkk (2012) yang menyatakan bahwa

semakin banyak jumlah spesies mangrove, semakin rumit pula bentuk kompetisinya. Dalam hal ini dapat berupa kompetisi dalam mendapatkan ruang untuk tumbuh, nutrient, ataupun banyak sedikitnya penetrasi cahaya yang dapat masuk kedalam perairan.

Avicennia marina banyak yang mati akibat stress karena kenaikan suhu dilokasi penelitian. Taniguchi (1999) dalam Suwigno, dkk (2009) menyebutkan bahwa dalam kondisi alami proses adaptasi sangat rendah dan persentase hidup mangrove sekitar 20% - 30%. Semai *Amarina* sebelum mengalami kematian mengalami kerontokan daun yang cukup banyak dan pucuknya mengering. Suhu yang tinggi menghalangi transport nutrient ke meristem, sehingga jaringan meristem mati dan pertumbuhan terhambat ditandai dengan rontoknya daun-daun. Suhu yang tinggi juga menyebabkan transpirasi tinggi, hal ini menyebabkan protoplasma mengalami dehidrasi akibat daun kekurangan air. Daun-daun *A.marina* yang rontok pada saluran tambak menyebabkan kecerahan perairan pada saluran menjadi rendah dan kekeruhan meningkat. Hal ini menyebabkan rendahnya penetrasi cahaya yang dapat masuk kedalam perairan. Odum (1971)

dalam Raharjo (2003) menyatakan bahwa kecerahan perairan merupakan faktor fisika yang menentukan jauhnya penetrasi cahaya yang masuk kedalam perairan yang dapat mendukung proses fotosintesis tanaman. Semakin cerah suatu perairan maka proses fotosintesis tanaman akan lebih baik, sehingga pertumbuhan tanaman akan lebih optimal, sebaliknya jika kecerahan perairan menurun radiasi sinar matahari yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis tumbuhan akan kurang dan pertumbuhan tanaman terhambat. Hal inilah yang diduga menyebabkan pertumbuhan semai terhambat/mati pada saat penelitian sehingga tingkat kelulushidupan menjadi rendah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan mengenai kualitas air dan pertumbuhan semai *Avicennia marina* pada lebar saluran tambak wanamina yang berbeda dapat ditarik kesimpulan sebagai bahwa lebar saluran tambak yang berbeda berpengaruh terhadap faktor lingkungan terutama parameter suhu. Perlakuan lebar saluran tambak wanamina yang berbeda tidak berpengaruh terhadap penambahan diameter batang dan kelulushidupan semai *Avicennia marina*.

Kualitas Air dan Pertumbuhan Semai *Avicennia marina* (Forsk.) Vierh pada Lebar Saluran Tambak Wanamina yang Berbeda

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	primadonakita.blogspot.com Internet Source	2%
2	id.scribd.com Internet Source	2%
3	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
4	pt.scribd.com Internet Source	1%
5	www.isluyandari.com Internet Source	1%
6	pt.slideshare.net Internet Source	1%
7	core.ac.uk Internet Source	1%
8	materikitorang.blogspot.com Internet Source	1%
9	nindiyanastiti.blogspot.com	

Internet Source

1%

10

eprints.uny.ac.id

Internet Source

1%

11

media.neliti.com

Internet Source

1%

12

eprints.unsri.ac.id

Internet Source

1%

13

Achmad Suhermanto, Sukenda Sukenda, Muhammad Zairin Jr., Angela Mariana Lusiastuti, Sri Nuryati. "TOKSISITAS SEL UTUH DAN EXTRACELLULAR PRODUCT (ECP) Streptococcus agalactiae β -HEMOLITIK DAN NON-HEMOLITIK PADA IKAN NILA (*Oreochromis niloticus*)", Jurnal Riset Akuakultur, 2019

Publication

1%

14

zulmiaditya.blogspot.com

Internet Source

<1%

15

repository.unhas.ac.id

Internet Source

<1%

16

repository.ung.ac.id

Internet Source

<1%

17

www.scribd.com

Internet Source

<1%

18

rinaldi6610.blogspot.com

Internet Source

<1%

19

ejournal.umm.ac.id

Internet Source

<1%

20

www.riaudailyphoto.com

Internet Source

<1%

21

Submitted to Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Gadjah Mada

Student Paper

<1%

22

docobook.com

Internet Source

<1%

23

Submitted to Unika Soegijapranata

Student Paper

<1%

24

Submitted to Syiah Kuala University

Student Paper

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Kualitas Air dan Pertumbuhan Semai Avicennia marina (Forsk.) Vierh pada Lebar Saluran Tambak Wanamina yang Berbeda

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8
