

Pengaruh Masa Inkubasi Pupuk dari Air Cucian Beras Terhadap Pertumbuhan Tanaman Sawi Hijau (*Brassica juncea* L.)

by Endah Dwi Hastuti

Submission date: 07-Jan-2020 01:03PM (UTC+0700)

Submission ID: 1239711335

File name: C32.pdf (390.93K)

Word count: 2208

Character count: 13298

Pengaruh Masa Inkubasi Pupuk dari Air Cucian Beras Terhadap ¹Pertumbuhan Tanaman Sawi Hijau (*Brassica juncea* L.)

Effect Of Fertilizer Incubation Period Of Rice Wash Water On Green Mustard Plant Growth (*Brassica juncea* L.).

Pipit Wijiyanti^{1*}, Endah Dwi Hastuti², Sri Haryanti²

¹Program Studi Biologi, Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro

²Departemen Biologi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang

*Email : pipitwiji04@gmail.com

Diterima 29 September 2018 / Disetujui 28 Januari 2019

7 PENDAHULUAN

Sawi hijau (*Brassica juncea* L.) merupakan sayuran yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi, dan menjadi salah satu komoditas sayuran yang cukup populer di Indonesia (Wahid dkk., 2013). Konsumennya mulai dari golongan masyarakat kelas bawah hingga golongan masyarakat kelas atas, sehingga permintaan akan sawi dari hari ke hari semakin meningkat (Nurshanti, 2010). Tingginya tingkat konsumsi dan permintaan pasar terhadap sawi hijau tidak diimbangi dengan tingkat produksi sawi hijau yang dilakukan oleh para petani sayur di Indonesia. Salah satu faktor penyebab rendahnya produksi sawi hijau yaitu, penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan dan dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang oleh sebagian besar petani sayur di Indonesia, sehingga dapat berpengaruh pada tingkat kesuburan tanah, yang berakibat pada hilangnya unsur hara dalam tanah. Salah satu solusi yang dapat dilakukan agar ketersediaan unsur hara tetap terjaga perlu dilakukan pemupukan menggunakan pupuk organik.

Pupuk organik adalah pupuk yang diproses dari limbah organik seperti kotoran hewan, sampah, sisa tanaman, serbuk gergajian kayu, lumpur aktif, yang kualitasnya tergantung dari proses atau tindakan yang diberikan (Yulipriyanto, 2010). Salah satu sumber yang dapat dijadikan sebagai pupuk organik untuk memperbaiki unsur hara tanah adalah pupuk organik yang dibuat dari limbah air cucian beras. Air cucian beras mengandung banyak nutrisi yang terlarut didalamnya diantaranya adalah protein, 80% vitamin B1, 50% fosfor, dan 60% zat besi. Protein dan vitamin B1 (thiamin) yang terkandung dalam air cucian beras pada tanaman memiliki peranan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Bahar, 2016). Protein merupakan sumber utama unsur N yang berperan penting untuk pertumbuhan vegetatif pada tanaman, sedangkan vitamin B1, berfungsi sebagai koenzim dalam metabolisme karbohidrat serta meningkatkan aktivitas hormon yang terdapat dalam jaringan tanaman, untuk mendorong pembelahan sel-sel baru (Amalia dkk., 2013).

11
Untuk menjadikan air cucian beras sebagai pupuk organik cair, perlu adanya perlakuan tertentu melalui masa inkubasi, tujuannya untuk mendekomposisi senyawa kompleks pada air cucian beras menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga saat digunakan sebagai pupuk dan diaplikasikan pada tamanan akan mudah diserap. Masa inkubasi sangat menentukan kematangan dari suatu pupuk, apabila masa inkubasi belum cukup, maka pupuk yang dihasilkan kualitasnya kurang baik bila digunakan (Fathini dkk., 2014).

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut hasil penelitian dari Handayani dkk., (2015), mengatakan bahwa air cucian beras dapat dijadikan sebagai pupuk organik cair sesuai dengan standar mutu pupuk organik cair, setelah dilakukan fermentasi selama 15 hari, pada waktu tersebut kandungan unsur hara setelah fermentasi 15 hari mengalami peningkatan. Beberapa penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa air cucian beras yang disimpan selama 2 minggu pada beberapa jenis tanaman dapat menggantikan pupuk anorganik (Elfarisna, dkk., 2013). Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh masa inkubasi yang berbeda dari air cucian beras terhadap pertumbuhan sawi hijau (*Brassica juncea* L.).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Struktur dan Fungsi Tumbuhan, Departemen Biologi Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah air cucian beras, molase, EM4, air, bibit tanaman sawi hijau, tanah, pupuk kandang, aseton 80%, dan kertas saring.

Pembuatan Pupuk Air Cucian Beras

Pembuatan pupuk dilakukan setiap lima hari sekali. Proses pembuatan pupuk diawali dengan menimbang beras sebanyak 250 gr, selanjutnya di cuci dengan air sebanyak 500 ml, dan dilakukan sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 1500 ml air cucian beras, kemudian air cucian

beras dicampur dan ditambahkan dengan molase dan EM4 dengan konsentrasi 100 ml, selanjutnya diaduk sampai homogen dan dimasukkan ke dalam botol plastik dan di inkubasi selama masa inkubasi tertentu yaitu tanpa masa inkubasi (0 hari), masa inkubasi 5 hari, 10 hari, 15 hari dan 20 hari.

Analisis Kandungan Hara N dan P

Analisis kandungan hara N pada pupuk air cucian beras dengan masa inkubasi berbeda dilakukan dengan menggunakan metode Kjeldahl, dan analisis kandungan P dilakukan dengan metode spektrofotometri.

Parameter Pengamatan

Pengamatan dilakukan setelah tanaman sawi hijau berumur 45 hari setelah tanam, yang meliputi: tinggi tanaman (cm²), jumlah daun

(helai), luas daun (cm²), bobot basah (g), bobot kering (g), jumlah klorofil total (μ mol) dan karotenoid (μ mol).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kandungan Hara N dan P

Hasil analisis kandungan hara N dan P pada pupuk air cucian beras dengan masa inkubasi berbeda berdasarkan Tabel 1, kandungan N tertinggi terdapat pada perlakuan P3 (inkubasi 15 hari) sebesar 0,07%, dan yang terendah terdapat pada perlakuan P1 dan P4 dengan kandungan N 0,04%. Demikian juga dengan kandungan unsur P, perlakuan P2 dan P3 memiliki kandungan P tertinggi yaitu 0,06%, dan pada perlakuan P1 memiliki kandungan P terendah dibandingkan dengan perlakuan lainnya yaitu hanya 0,03%.

Tabel 1. Hasil analisis N dan P pada pupuk air cucian beras 0, 5, 10, 15 dan 20 hari inkubasi

Parameter	Perlakuan				
	P0 (0 hari)	P1 (5 hari)	P2 (10 hari)	P3 (15 hari)	P4 (20 hari)
N-Total (%)	0,06	0,04	0,05	0,07	0,04
P ₀ O ₅ (%)	0,04	0,03	0,06	0,06	0,04


Berdasarkan Tabel 1, kandungan hara N dan P yang berbeda pada masing-masing perlakuan disebabkan oleh masa inkubasi. Menurut Cesaria *dkk.*, (2014), inkubasi adalah penguraian unsur organik kompleks terutama karbohidrat untuk menghasilkan energi melalui reaksi enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang biasanya terjadi dalam keadaan anaerob dan diiringi dengan pembebasan gas. Hasil analisis kandungan hara N dan P, pada masa inkubasi 15 hari memiliki kandungan N tertinggi dibandingkan perlakuan lainnya, karena komponen yang terkandung pada air cucian beras telah didekomposisi dengan sempurna oleh mikroba dan juga masa inkubasi 15 hari menyebabkan tingkat kematangan yang tepat pada pupuk. Hasil lainnya pada perlakuan tanpa masa inkubasi (0 hari), juga memiliki kandungan N yang tinggi, karena dalam

air cucian beras segar sudah terdapat kandungan komponen N terlarut dalam jumlah yang tinggi. Nitrogen terlarut yang terdapat pada perlakuan 0 hari, kemungkinan berasal dari butiran aleuron yang seringkali ikut terkikis ketika mencuci beras sebelum diolah menjadi nasi yang berupa N-organik dan terdiri dari komponen protein. Menurut Jorgensen (2009), nitrogen terlarut didefinisikan sebagai material yang berukuran kurang dari 0,2 μ m, yang di dalamnya terdapat molekul organik dan senyawa seperti urea, asam amino dan protein. Effendi (2003), juga mengatakan bahwa, nitrogen merupakan senyawa kimia yang terdiri dari nitrogen organik dan anorganik. N-organik terdiri dari protein, asam amino dan urea, dimana senyawa N-organik tersebut selanjutnya dapat ditransformasi menjadi NH₄⁺ dan dioksidasi menjadi NO₃⁻ dan NO₂⁻.

Tinggi Tanaman

Berdasarkan hasil analisis statistika, pemberian pupuk air cucian beras dengan masa inkubasi berbeda dapat berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman. Pertumbuhan tinggi tanaman merupakan salah satu bentuk adanya peningkatan pembelahan dalam meristem apikal,

sehingga mendorong terjadinya pertumbuhan primer. Berdasarkan Gambar 1, tinggi tanaman pada perlakuan P3 memberikan hasil terbaik dan tidak berbeda nyata dengan P0 dan P4. Hal ini karena pemberian pupuk air cucian beras pada perlakuan tersebut mampu mensuplai unsur hara N yang cukup bagi pertumbuhan tanaman.




Gambar 1. Rerata Pertambahan Tinggi Tanaman Sawi Hijau

Menurut Sari *dkk.*, (2017), proses pembelahan sel akan berjalan dengan cepat dengan adanya ketersediaan N yang cukup. Unsur N mempunyai peran utama untuk merangsang pertumbuhan secara keseluruhan dan khususnya pertumbuhan batang yang dapat memacu pertumbuhan tinggi tanaman. Menurut Fathini *dkk.*, (2014), mengatakan kandungan unsur hara, seperti N dan P dalam pertumbuhan tanaman sangat penting sehingga ketersediaannya harus sesuai dengan kebutuhan dari tanaman itu sendiri, dan untuk pertumbuhan tanaman khususnya pertumbuhan vegetatif, nitrogen dibutuhkan dalam jumlah yang besar untuk setiap tahapan pertumbuhan tanaman. Fahmi *dkk.*, (2010), juga mengatakan bahwa unsur hara nitrogen dan fosfor merupakan unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang besar, apabila tanaman kekurangan nitrogen pertumbuhannya menjadi lambat, dan tanaman menjadi kerdil, sementara kekurangan fosfor menyebabkan perakaran tidak berkembang dengan baik, dan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat.

Jumlah Daun

Berdasarkan hasil analisis statistika pemberian pupuk air cucian beras tidak memberikan pengaruh yang nyata pada jumlah daun tanaman sawi hijau. Gambar 2, menunjukkan adanya kecenderungan perlakuan tanpa masa inkubasi (0 hari) dan dengan inkubasi 15 hari memiliki jumlah daun terbanyak dibandingkan dengan perlakuan lainnya.

Daun merupakan organ tanaman tempat mensintesis makanan untuk kebutuhan tanaman maupun sebagai cadangan makanan (Dua ja, 2012). Nutrisi sangat berpengaruh pada pembentukan daun terutama unsur N. Kandungan hara N yang tinggi pada masa inkubasi 0 hari dan 15 hari, menyebabkan jumlah daun yang tumbuh semakin bertambah. Ikhtiyanto (2010), mengatakan bahwa unsur N berperan untuk pertumbuhan vegetatif, yaitu pembentukan tunas, pembentukan daun, dan pertumbuhan batang, apabila pasokan N tersedia dalam jumlah yang cukup, daun tanaman akan tumbuh besar dan memperluas permukaan yang tersedia untuk proses fotosintesis.




Gambar 2. Rerata Jumlah Daun Tanaman Sawi Hijau

Luas Daun

Berdasarkan hasil analisis statistika, perlakuan pemberian pupuk air cucian beras dengan masa inkubasi berbeda tidak berpengaruh terhadap luas daun tanaman sawi hijau. Hasil rerata luas daun dapat dilihat pada Gambar 3. Meskipun masa inkubasi tidak berpengaruh tetapi ada kecenderungan pada perlakuan tanpa masa inkubasi (0 hari) memiliki luas daun tertinggi

dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Daun merupakan organ penting tanaman yang berperan dalam proses fotosintesis karena terdapat klorofil. Luas daun dari setiap tanaman, umumnya dipengaruhi oleh jumlah daun. Semakin banyak jumlah daun maka luas daun dari suatu tanaman juga semakin lebar. Ifantri dan Ardiyanto (2015), menyatakan bahwa suatu tanaman semakin banyak jumlah daunnya maka luas daunnya akan semakin lebar.



Gambar 3. Rerata Luas Daun Tanaman Sawi Hijau

Bobot Basah dan Bobot Kering

Berdasarkan hasil analisis statistika terdapat pengaruh yang nyata pada bobot basah sawi hijau tetapi tidak pada bobot kering. Gambar 4 menunjukkan rerata bobot basah dan bobot kering tertinggi terdapat pada perlakuan pemberian


pupuk air cucian beras tanpa masa inkubasi (0 hari).

Bobot basah dan bobot kering dari suatu tanaman dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara N yang cukup untuk membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman seperti pertumbuhan tinggi

tanaman dan pembentukan daun. Ardiansyah (2013), mengatakan bahwa, faktor ketersediaan unsur hara dapat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga berpengaruh pada berat segar tanaman. Harjadi (2007), juga mengatakan bahwa ketersediaan unsur hara berperan penting dalam mempengaruhi biomassa dari suatu tanaman.

Bobot basah dan bobot kering terdiri atas semua bagian tanaman sawi hijau. Semakin banyak daun maka bobot basah dan bobot kering

tanaman juga akan meningkat. Tinggi tanaman juga berpengaruh pada bobot basah tanaman. Semakin tinggi tanaman sawi hijau dan semakin banyak jumlah daunnya, maka bobot basah juga akan meningkat. Nurdin (2011) mengatakan jumlah daun dapat berpengaruh terhadap peningkatan bobot kering tanaman karena daun merupakan tempat akumulasi hasil fotosintat tanaman. Menurut Ardiansyah (2013), juga menyatakan bahwa hasil berat kering merupakan keseimbangan antara fotosintesis dan respirasi.




Gambar 4. Rerata Bobot Basah dan bobot kering Tanaman Sawi Hijau

Jumlah Klorofil dan Karotenoid

Hasil analisis statistika, pemberian pupuk air cucian beras dengan masa inkubasi berbeda dapat berpengaruh terhadap jumlah klorofil total

dari tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) tetapi tidak berpengaruh pada jumlah karotenoid. Gambar 5, menunjukkan semakin lama masa inkubasi jumlah klorofil total dan karotenoid semakin menurun.



Gambar 5. Rerata Jumlah Klorofil Total dan Karotenoid Tanaman Sawi Hijau

Pembentukan pigmen klorofil maupun karotenoid pada tanaman dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya dari ketersediaan unsur hara. Unsur hara dalam proses fotosintesis memiliki

peranan yang penting untuk pembentukan protein dan klorofil, khususnya hara N. Menurut Setyanti dkk., (2013), nitrogen menjadi bagian dari molekul klorofil yang mengendalikan kemampuan tanaman

¹⁰ dalam melakukan fotosintesis. Nitrogen berperan sebagai penyusun pigmen klorofil.

Penurunan jumlah klorofil dan karotenoid pada tanaman sawi karena adanya kompetisi penggunaan unsur N dan P untuk pertumbuhan tanaman dan pembentukan klorofil. Kandungan N dan P yang terdapat pada setiap perlakuan lebih dioptimalkan oleh tanaman sawi untuk mempercepat pertumbuhan tinggi tanaman, meningkatkan jumlah anakan dan membuat tanaman menjadi besar, sehingga pasokan N untuk pembentukan klorofil menjadi lebih sedikit.

KESIMPULAN

⁵ Masa inkubasi pada pupuk air cucian beras berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi tanaman, bobot basah dan jumlah klorofil total tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah daun, luas daun, bobot kering dan jumlah karotenoid tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.). Pertumbuhan tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.), perlakuan masa inkubasi 15 hari, memberikan hasil terbaik pada parameter tinggi tanaman. Perlakuan 0 hari memberikan hasil terbaik pada parameter jumlah daun, luas daun, bobot basah, dan bobot kering tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.). Masa inkubasi yang semakin lama justru menghambat pembentukan pigmen klorofil dan karotenoid dari tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.).

Pengaruh Masa Inkubasi Pupuk dari Air Cucian Beras Terhadap Pertumbuhan Tanaman Sawi Hijau (*Brassica juncea* L.)

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

24%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

4%

2

Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium

Student Paper

3%

3

Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

3%

4

media.neliti.com

Internet Source

2%

5

Submitted to Universitas Jenderal Soedirman

Student Paper

1%

6

docobook.com

Internet Source

1%

7

jurnal.unisbablitar.ac.id

Internet Source

1%

8

www.scribd.com

Internet Source

1%

9

online-journal.unja.ac.id

	Internet Source	1%
10	muzayyinulghufron.blogspot.com Internet Source	1%
11	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
12	jurnal.untan.ac.id Internet Source	1%
13	edukasi.kompasiana.com Internet Source	1%
14	e-journal.kopertis4.or.id Internet Source	1%
15	es.scribd.com Internet Source	<1%
16	Submitted to Academic Library Consortium Student Paper	<1%
17	Submitted to Sogang University Student Paper	<1%
18	Lies Setijaningsih, Bambang Gunadi, Eddy Supriyono. "BUDIDAYA UDANG GALAH (Macrobrachium rosenbergii (de Man, 1879)) SISTEM AKUAPONIK BERBASIS POLIKULTUR DENGAN IKAN TAMBAKAN (Helostoma temminckii Cuvier, 1829)", BERITA	<1%

BIOLOGI, 2019

Publication

19

Mody Lempang, Hermin Tikupadang. "APLIKASI ARANG AKTIF TEMPURUNG KEMIRI SEBAGAI KOMPONEN MEDIA TUMBUH SEMAI MELINA", Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea, 2013

Publication

<1%

20

protan.studentjournal.ub.ac.id

Internet Source

<1%

21

nibandul.blogspot.com

Internet Source

<1%

22

eprints.uns.ac.id

Internet Source

<1%

23

text-id.123dok.com

Internet Source

<1%

24

Riko Cahya Putra, Titik Widyasari. "Utilization of Rawa Pening Peat as Organic Fertilizer Briquettes and Its Effects on The Growth of Rootstock Rubber Plant", Jurnal Penelitian Karet, 2018

Publication

<1%

25

kuplukluntur.blogspot.com

Internet Source

<1%

26

Submitted to Institut Pertanian Bogor

Student Paper

<1%

27

repository.usd.ac.id

Internet Source

<1%

28

Wawan Setiawan, Octavianus Lumban Tobing, Arifah Rahayu. "Growth and Production of Lemon Basil (*Ocimum basilicum* L.) Accessions Grown in Different Compositions of KCl Fertilizer and Cow Urine", JURNAL AGRONIDA, 2019

Publication

<1%

29

publikasi.unitri.ac.id

Internet Source

<1%

30

fr.scribd.com

Internet Source

<1%

31

eprints.unsri.ac.id

Internet Source

<1%

32

id.123dok.com

Internet Source

<1%

33

Submitted to Universitas Brawijaya

Student Paper

<1%

34

Submitted to Universitas Kristen Satya Wacana

Student Paper

<1%

35

Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Student Paper

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Pengaruh Masa Inkubasi Pupuk dari Air Cucian Beras Terhadap Pertumbuhan Tanaman Sawi Hijau (*Brassica juncea* L.)

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8
